

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百十八

詳校官太醫院吏目_臣宋桂

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官進士_臣楊懋珩

校對官中書_臣田尹衡

謄錄監生_臣龐兆懋

欽定四庫全書

普濟方卷三百十八

明

周王朱橚撰

婦人諸疾門

血風體痛

附論

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風
冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節與正
氣相擊故令疼痛也

方

當歸湯

出聖惠
總錄

治婦人血風身體百節痛疼乍寒乍

熱經脈不利日漸羸瘦

當歸

焙

黃耆

牛膝

酒浸
焙

枳殼

麩炒

芍藥

羌活

去
蘆

人參

附子

炮裂去
皮臍

芍藥

木香

檳榔

桔梗

炒

牡丹皮

去
心

沈香

甘草

炙

地骨皮

半夏

薑汁製炒
各一兩

桂心

柴胡

二兩

蓬

木

煨一
兩半

熟地黃

焙二
兩

橘紅

一兩
半

荊芥穗

鼈甲

去帶邊醋
炙各二兩

右咬咀每服三錢水一鍾生薑三片棗二枚葱二寸
煎至七分去滓溫服

馬鞭草散 治婦人血攻肢體疼痛或覺麻痺乍寒乍
熱飲食減少並皆治之

馬鞭草梗去 荆芥穗 北柴胡 烏梅肉各二兩

枳殼 白芷 羌活 白芍藥各一兩 秦艽 烏

藥 麻黃 木香各半兩 當歸 川烏炮 甘草

各一兩

右咬咀每服三錢水一鍾生薑三片棗二枚葱白二寸連鬚煎至七分日午臨睡溫服常服無時有孕亦可服

虎骨散

出聖惠方

治婦人血風攻注肢體疼痛

虎脛骨

一兩半酥炙黃

桂心

兩一

芎藭

兩一

牛膝

一兩去毛

海桐皮

二兩

羌活

兩半

當歸

一兩炒

天麻

兩一

附子

一兩炮裂去皮臍

骨碎補

兩一

沒藥

兩一

琥珀

兩一

木香

兩半

麝香

一分研入

右為細末研令勻每服二錢不拘時溫酒調服

芎藭散

治婦人血風身體疼痛心胃壅滯少思飲食

川芎

兩一

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁

炒三錢

細

辛

羌活

桂心

當歸

木香

牛膝

各三錢

枳殼

甘草

各半兩

右㕮咀每服三錢水一鍾薑三片煎至七分去滓不

拘時服一方名大芎散

羚羊角散

出聖惠方

治婦人血風身體疼痛手足無力心

神煩悶

羚羊角屑

酸棗仁炒

乾地黄

檳榔各一兩

五加皮

防風

赤芍藥

各三分

甘草半兩

骨碎

補炒

當歸

海桐皮

川芎

各三兩

右為細末每服二錢溫酒調服一方為散每服三錢水一鍾煎至六分稍熱服一方加生薑三片煎服

茯神湯

出聖濟總錄

治婦人血風頭目昏眩身體疼痛怔

忪躁煩手足心熱兼治傷寒

茯神

去木

蔓荊子

赤茯苓

枳殼

麩炒各二兩

麻

黃

去節一兩半

防風

黃芩

芍藥

石膏

羌活

去蘆

獨活

甘草

炙各一兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑五片薄荷五葉煎八

分去滓熱服

牛膝散

出聖惠方

治婦人血風攻注身體疼痛發渴不止

四肢無力

牛膝

一兩

附子

三分炮裂去皮臍

萆薢

三分

五加皮

三分

丹參三分

當歸一兩炒

桂心一兩

海桐皮一兩

芎藭一兩

枳殼一錢炒

仙靈脾三分

甘草半兩炙

右㕮咀每服三錢水一鍾薑三片煎七分去滓不拘

時熱服

海桐皮散

出聖惠方

治婦人血風身體疼痛骨節發熱作

渴不止

海桐皮

桂心

白芷

當歸炒

漏蘆

羚羊

角屑

川芎各一兩

赤芍藥半兩

沒藥

木香

檳榔

川大黃

煨各半兩

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服

當歸散

出聖惠方

治婦人血風身體疼痛筋脈拘急

當歸

半兩炒

虎脰骨

半兩酥炙

附子

半兩炮裂去皮臍

桂

心

半兩

水蛭

半兩炒

羚羊角屑

半兩

防風

去蘆

辭

各半兩

牛膝

半兩

川芎

半兩

琥珀

三分研細

羌活

半兩

右為細末每服二錢豆淋酒不拘時調服

骨碎補散 治婦人血風身體疼痛腰足無力

骨碎補 海桐皮 芎藭 仙靈脾 側子各一

當歸 白蒺藜炒去刺 羌活 桂心 木香

桃仁湯泡去皮
尖雙仁炒 枳殼各三分
麩炒

右為細末每服一錢豆淋酒不拘時調服

何首烏散出聖
惠方 治婦人血風身體疼痛手足麻痺腰

髀沈重牽拽不隨

何首烏 羌活 當歸 羚羊角屑 赤箭 附

子炮裂去
皮臍 桂心 赤芍藥 芎藭各三 牛膝

一兩 防風 半兩 威靈仙 一兩

右為細末每服二錢豆淋酒不拘時調下

琥珀丸

出聖惠方

治婦人血風身體百節疼痛

琥珀

麒麟竭

敗龜板 炙

地龍 炒

當歸

檳榔 各一兩

安息香

硃砂 水飛過

木香

沒藥

各三分

雄黃

半兩水飛過

麝香

一分別研

右為細末研令勻煉蜜搗二三百杵丸如菉豆大每日空心酒下二十丸晚又一服

鼈甲散出聖濟總錄

治婦人血風攻注百節疼痛或因打

撲瘀血不散遇天陰雨冷四肢痠痛諸般風滯經水

不通等疾

鼈甲

炙醋

虎骨

酒炙各三兩

漏蘆

當歸炒

桂心

炙

川芎

各半兩

天雄

炮裂去皮臍一兩

羌活一兩

牛膝

酒浸焙

沒藥

各一兩

右為細末一服二錢溫酒調服

鼈甲散 治婦人血風身體疼痛胃脇脹滿心煩熱躁

筋脈拘急經水不利虛勞等疾

鼈甲

去帶邊醋炙

大黃炒

羌活

硝石

枳殼麩炒

當歸炒

芎藭 吳茱萸

同黑豆炒去豆不用

檳榔煨

牛膝

酒浸焙各半兩

右咬咀每服三錢水一鍾薑五片煎至七分去滓不

拘時溫服

芎藭湯

出聖濟總錄

治婦人血風攻注身體疼痛頭目昏

眩口苦舌乾多困少力時發寒熱之症

芎藭 芍藥 牡丹皮 各一兩 羌活 甘菊花

防風 甘草 炙各二兩 柴胡 半夏 薑汁製作餅子 曝乾各一兩

右咬咀每服三錢水一鍾生薑三片薄荷五葉煎七分去滓溫服

羌活散 出聖濟總錄 治婦人血風勞倦身體百節疼痛疾

羌活 兩一 附子 一枚炮裂 牡丹皮 芍藥 海

桐皮 當歸 焙 桂心 蒲黃 各半兩

右為末每服一錢溫酒調下日三五服

治婦人血風渾身疼痛脾寒骨蒸

馬鞭草

柴胡

秦艽

當歸

乾漆

炒去烟為度

青蒿子

荊芥

甘草

各等分

右咬咀每服三錢水酒各一鍾半烏梅半箇桃柳枝
三寸薑棗煎八分溫服

羌活散

治婦人血風身體骨節發歇疼痛

羌活

三分

桂心

三分

敗龜板

三兩塗酥炙令黃

骨碎補

道人頭

三分

虎脰骨

二兩酥炙黃

沒藥

三分

地龍

三分
炒 紅花子 三分
炒

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服

沒藥羌活散 治婦人血風四肢疼痛不思飲食

沒藥 研 羌活 桂心 山茱萸 赤芍藥 牡

丹皮 附子 炮裂去皮
臍各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下若病甚者用童子小便
便生地黃汁半盞同前藥煎至八分溫服

愈痛丸 治身疼腰痛妊娠亦如之

續斷

杜仲

炒斷
絲

山藥

川芎

獨活

狗脊

火燎去毛酒
浸一宿焙乾

草薢

酒浸焙乾急用
不浸各等分

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服五十丸空心鹽酒下孕婦阿膠湯送下腰痛者有腎經虛損風冷乘之而疼者有勞役過多而疼者有飽食而臥此則成腰脊重而疼者腎有濕也但陽病難免陰病則腰痛之病此因腎氣不足宜服愈痛丸妊娠腰痛者損勞腎傷動其候風寒所侵血氣相搏婦人腸繫胞絡腰

疼孕難安保愈痛丸主之產後腰間所苦既產而有
所損耗腎經氣血暴傷風邪得入因而留滯故令腰
疼宜服愈痛丸

芍藥知母湯

出大全良方

治諸節痛疼身體魁肥脚腫如

脫頭眩失氣溫溫欲吐者服之

桂心 知母 防風 各四兩 芍藥 甘草 麻黃

去節 附子 炮各三兩

右㕮咀每服四錢水一鍾半薑五片煎至七分去滓

空心服一方用白朮川芎杏仁半夏

羌活散

出聖濟總錄

治婦人血風身體發歇疼痛

羌活

去蘆

桂心 沒藥

虎脰骨

炙酥

骨碎補

去毛

紅花子

炒各一兩

右咬咀為細末每服二錢不拘時溫酒調服

羌活當歸散

出聖濟總錄

治婦人血風身體發歇疼痛

羌活

當歸

焙

白茯苓

桂心

沒藥

虎脰

骨

酥炙

骨碎補

去毛酒浸焙

紅花子

各一兩

右為散每服二錢空心溫酒調下

仙靈脾散

出聖惠方

治婦人血風身體疼痛不止

仙靈脾

虎脰骨

酥炙

附子

一兩炮裂去皮臍

躑躅花

二兩醋炒

防風

一兩去蘆

牛膝

右為細末每服一錢不拘時溫酒調服

當歸沒藥散

出大全良方

治婦人血風血氣腹脇刺疼筋

攣骨痺手足麻木皮膚瘙痒

當歸

五靈脂

炒

沒藥

各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服三十丸空心薑湯送下

四生丸

出大全良方

治婦人血風骨節疼痛臂擡舉不起

足行履不得半身頑麻

白殭蠶炒

地龍去土

白附子

五靈脂

草烏

去皮尖各等分

右為細末米糊為丸梧桐子大每服二十丸茶酒任下或作末酒調半錢亦可

何首烏丸

出經驗濟世方

治婦人血風久虛風邪停滯手足

痿緩肢體麻痺皮膚瘙癢並五痔下血

何首烏

一斤赤白各半

芍藥

二兩赤白各半

右為細末煮麵糊和丸如梧桐子大一服三四十丸空心米飲送下

血風走症

附論

夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫泆皮膚卒然掣痛遊走無有常處故為走症也加減小續命湯主之

方

牛膝散

出聖惠方

治婦人血風走症腰脚疼痛不可忍

牛膝兩一

虎脰骨

二兩酥炙

赤芍藥

兩一

琥珀

兩一

桂心

兩一

當歸

兩一炒

芎藭

沒藥

麒麟竭各

兩

乾漆

二兩炒去烟

防風

兩一

木香

兩半

地龍

兩半

炒

酸棗仁

兩一炒

生乾地黄

兩一

羌活

兩一

右為細末每服一錢不拘時酒調溫服

海桐皮湯

治婦人血風攻症四肢無力勞倦頭目昏

眩背項拘急骨節疼痛

海桐皮 桂心 木香 天麻 人參 羌活去蘆

獨活去蘆 牛膝酒浸焙 金毛狗脊 石斛去根

黃耆 防風去蘆 鼈甲去裙邊醋炙 草薺 麻黃去節

各三分

右為散每服三錢水一鍾薑二片煎至八分去滓少熱服如傷寒頭疼壯熱入葱白煎兩服汗出愈

獨活湯出聖濟總錄

治婦人血風攻症脚膝虛腫或上焦

不利

獨活

去蘆

桂心

芎藭

白朮

防風

去蘆

茵芋

人參

枳殼

炒麩

海桐皮

甘草

炙半兩

薏

苡仁

附子

炮裂去皮臍

麻黃

去節滾水泡

赤茯苓

苓

牛膝

酒浸微焙三分

右咬咀每服三錢水一盞薑半分煎七分不拘時溫

服

骨碎補散

出聖濟總錄

治婦人血風攻注身體疼痛手足

癰痺筋脈拘急或時寒熱經脈不調

骨碎補

一兩

乳香

一兩

沒藥

一兩

青橘皮

湯泡去白

一兩

木香

一兩

甜瓜子

炒一兩

乾漆

炒去烟一兩半

自然銅

醋煨七次一兩

木鼈子

去殼一兩半

蒼朮

米泔水浸炒一

半兩

乾薑

炮

芫花

醋浸一日炒焦

血竭

各一兩

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒

調下醋湯亦可日三服

天麻散

出聖濟總錄

治婦人血風毒氣內外走注皮膚骨

節寒熱疼痛燥濕麻木不仁者並皆服之

天麻

芎藭

羌活

防風

去蘆

當歸

焙

蒺藜

炒去刺

桂心

白附子

炮

全蠍

炒

天南星

炮

烏頭

炮裂去皮

枳殼

麩炒

地骨皮

各半兩

麻黃

去節

半兩

麝香

少許半錢

右為細末每服一錢薄荷湯調不拘時服

枳殼羌活散

治婦人血風攻疰四肢麻木瘙癢如有

蟲行或肌肉赤腫疼痛肩背拘急神情倦怠

枳殼

二兩 麩炒

羌活

去蘆

牡荊實

人參

一兩 半

防

風

二兩

甘草

一兩

牡丹皮

二兩 半

芎藭

芍藥

白茯苓

白芷

各二兩

細辛

當歸

各一兩

右為末煉蜜和丸如彈子大一服一丸滾白湯細嚼

呷之

漏蘆散

治婦人血風走注疼痛無常

漏蘆

當歸

分三

桂心

地龍

炒去土

防風

羌

活白芷

沒藥

各半兩

牛膝

分三

虎脰骨

酥炙

一兩 甜瓜子半兩 敗龜板一兩 醋炙

右為細末每服二錢不拘時調服

當歸散 治婦人血風攻疰百節疼痛皮膚虛腫筋脈拘急或生癰疹寒熱不時飲食無味

當歸焙

延胡索

蒲黃炒

川芎

赤芍藥

生地黄焙

澤蘭葉

天麻

地榆醋炒

桂心

滑石各一兩

蓬朮煨一兩

右為末每服二錢溫酒調下或薄荷茶清下如手足

卒冷氣血奔心痛薑酒下

麝香沒藥散 治婦人血風攻疰毒氣遊走肢體疼痛

麝香分 沒藥半兩 敗龜板酒炙二兩 牡丹皮 芍

藥 骨碎補一兩 麒麟竭 枳殼麴炒各半兩 當歸

焙 甜瓜子炒各一兩 虎脰骨酒炙二兩 自然銅醋煨七次

半兩

右除麝香沒藥外為散和勻每服一錢豆淋酒調下

日三服

沒藥散

出聖惠方

治婦人血風走注肢節疼痛發歇來往

不定

沒藥 乳香 芎藭 當歸 桂心 漏蘆 木

香

各半兩

琥珀

白芷

地龍

炒去土各三分

麝香

安息香

各一分

右為細末研令勻一服一錢溫酒調服

琥珀散 治婦人血風走注疼痛往來發歇

琥珀 當歸

川大黃

各三分

桂心

牛膝

各一兩

沒藥 麒麟竭 延胡索 防風 羌活 乾

漆 羚羊角屑

各半兩

右為散每服一錢酒調服

雄黃散 治婦人血風走注疼痛

雄黃

半兩

烏蛇

二兩酒浸去皮骨炙

地龍

半兩炒

蚬

半兩

生用

麒麟竭

半兩

赤箭

半兩

附子

半兩炮裂去皮臍

桂

心

半兩

沒藥

半兩

木香

半兩

麝香

一分

白芥子

半升

右為細末研令勻每服一錢酒調服

地黃散 治婦人血風走注氣冷不調四肢麻木頭目

浮腫

生地黄 牛膝酒浸 蒲黃炒 川芎 當歸 桂

心 劉寄奴 延胡索 烏頭炮裂去皮臍 白芍

蓬朮 煨各一兩

右為末每服二錢酒調服

虎骨散 出聖惠方 治婦人血風走注疼痛無時

虎脰骨

酥炙二兩

當歸

炒一兩

威靈仙

一兩

牛膝

一兩

羌活兩一 全蠍半兩 漏蘆分三 芎藭分三 琥珀

半兩 桂心 沒藥分三

右為細末每服一錢酒調服

大効虎骨散 治血風走注疼痛丈夫筋骨疼跌打損傷痛者

虎脰骨酥炙 敗龜版酥炙 桂心 延胡索 威靈

仙當歸 地龍 牛膝 漏蘆 自然銅醋淬七次

各一兩

右為細末每服二錢熱酒調下一日一服

海桐皮煎 治婦人血風走注皮膚瘙癢或丹疹起筋

脉肌肉疼痛者亦可服有効

海桐皮

酒浸炙一兩

桂

去麋皮半兩

附子

炮裂去皮臍一兩

牛膝

酒浸切焙二兩

甘草

炙一兩

大黃

炒坐

羌活

去蘆

獨活

去蘆頭各一半

右為末每服次秤三兩先用黑豆一盞生薑半兩切碎水五升煎至三升絞出滓入前藥末煎如稀餚以

瓷瓦合盛每服一匙頭煎當歸酒下

丹參散

出聖濟總錄

治婦人血風在四肢走注疼痛

丹參 人參

苦參 各二兩半

雷丸

牛膝

酒浸切焙

防風

去

白附炮

白花蛇

酒浸三宿去皮骨炙各一兩

右為末每服三錢煎甘草酒調下

油煎散

出聖濟總錄

治婦人血風攻症四肢腰背疼痛嘔

逆醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手脚麻痺血

海冷敗方見本門風勞氣類即大効油煎散

木香湯

出聖濟總錄

治婦人血風勞氣下注腰脚上攻頭

目

木香

沒藥

烏頭

炮去皮臍

當歸

切焙

檳榔

剉

五加皮

剉

無食子

桂皮

血竭

研各一兩

赤芍

藥

半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎服入油三兩滴再煎七分空心日午夜臥去滓溫服

赤箭丸

出聖惠方

治婦人血風走注疼痛不定

赤箭兩半

天南星

炮裂半兩

沒藥兩半

白附子

炮裂半兩

去皮

乾蠍

微炒半兩

白殭蠶

微炒半兩

芎藭兩半

膩

粉錢一

地龍

微炒半兩

右為細末以糯米飯為丸如菉豆大每服五丸溫酒下不計時候

羌花散

出聖惠方

治婦人血風走注疼痛

羌花兩

獨活兩

蔓荊子

三兩

防風

二兩

去蘆頭

吳茱萸

一兩半

蛇床子

二兩

柳中蟲屑

一升

荊芥

三 鬼箭羽 兩三

右為散以醋拌炒令熟為兩處布裏更番熨之

附子散

出聖惠方

治婦人血風走注腰膝骨節疼痛

附子

五兩生用

薰陸香 兩一

松脂 半一兩

杏仁

一兩浸去

皮尖研

桂心 兩一

當歸

一兩剉微炒

芸臺子 兩一

芫

花 兩一

巴戟

一兩去皮

右為末鎔黃蠟五兩攪和諸藥捏作片裏疼處効

當歸散

出聖濟總錄

治婦人血風走注上攻頭目昏眩四肢

疼痛皮膚癢疹

當歸

焙切

烏頭

炮去皮臍

芍藥

延胡索

京三稜

煨

蓬莪茂

煨

芎藭

各一兩

右為末每服二錢溫酒調下空心日午臨臥服

牡丹丸

出聖濟總錄

治婦人血風走注上攻頭目昏重下

注腰脚酸疼遍身刺痛

牡丹皮

一兩

烏頭

炮裂去皮臍半兩

赤芍藥

一兩

地龍

去土炒

當歸

切焙

赤小豆

青橘皮

湯浸去白焙各半兩

右為末醋煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸生薑醋

湯或酒下

治婦人血風走注疼痛

出聖
愈方

蔓陀羅子

分一

地龍

分一
微炒

川烏頭

分一
炮裂
去皮臍

桂心

兩半

白芥子

分一

芸臺子

分一

右為細末每一字以薄荷熱酒調下不計時候

又方

出聖
愈方

羌花

兩三

柳中蟲屑

合五

漢椒

兩二

桂心

兩一

桑

根白皮

三兩

芸臺子

半升

右為末用醋一升拌和蒸令熟用青布裹熨痛處冷即更入醋蒸之

沒藥丸

出聖方

治婦人血風下注脚生瘡

沒藥

研

地龍

去土炒

乳香

研

牛膝

酒浸切炒

胡

桃仁

研各三分

右為末酒煮麵糊丸如棗豆大每服二十九丸食前煎溫酒下日三服

芍藥湯

出聖濟總錄

治婦人血風走注渾身疼痛心忪恍

惚頭目昏眩

赤芍藥

牡丹皮

桂皮去麁

當歸

焙切一兩

雲薑

子

研半兩

右麁搗篩每服二錢水一盞酒少許同煎至七分去

滓溫服

防風湯

出聖濟總錄

治婦人血風走注上焦不利頭目昏

重少力多倦渾身刺痛四肢麻木

防風

去義

威靈仙

赤芍藥

牡丹皮

各一兩

烏

頭炮裂去皮
臍用半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫酒

服不拘時候

牡丹湯

出聖濟總錄

治婦人血風攻心煩悶腹內疼痛

牡丹皮

一兩

大黃

剉炒

赤芍藥

當歸

切焙各半兩

乾荷葉

一兩

右麤篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

候

五靈散

出聖濟總錄

治婦人血風走注疼痛

五靈脂

一兩

當歸

切焙一兩

獨活

一兩

薑黃

一兩

右為末每服二錢水半盞煎服

烏金散

出聖濟總錄

治婦人血風勞氣攻疰四肢身體疼

痛

烏頭

剉一兩

草烏

剉二兩

亂髮

三兩

五靈脂

二兩

已上四味入在一瓦罐內鹽泥固濟候乾燒令通赤

候冷取出細研

當歸

切焙二兩

乳香

研

沒藥

研

延胡索

半兩

自

然銅

煨醋淬七遍一分

右搗研為末入前藥研勻每服一錢空心食前溫酒

調下

治血風走注痛無常定

出聖惠方

漏蘆

半兩

乾蠍

半兩微炒

沒藥

半兩

芸臺子

半兩

右為細散每服半錢溫酒下不計時候

小黑神丸

出危氏方

治血風走注攻刺半身不遂麻痺瘡

癢急口眼喎斜言語蹇澀手足拘攣

烏頭箇

芫花

錢五

乾薑

右為末醋煮令乾更杵為末再入桂心天麻海桐皮
黑豆為末入前藥和勻別用黑豆煮極爛研如泥以
豆汁調前末研合為丸每服七丸至十丸以豆淋酒
下忌一切毒物

躑躅丸

出聖濟總錄

治婦人血風走注隨所留止疼痛

躑躑花

乾蠍全者炒

地龍陰乾二條

烏頭炮炙去皮

臍各半兩

右為末煉蜜丸如小豆大每服五丸至七丸煎荊芥

酒下日三服

又方

出聖惠方

治婦人血風走注疼痛

芸臺子

兩半

亂髮灰

兩半

麝香錢一

右為細散每服一錢熱酒調下不計時候

治婦人血風走注入骨體疼痛不可忍

虎脰骨

一斤塗酥
炙令黃色

赤芍藥

二兩

桂心

三兩

右搗碎用生絹袋盛用清酒一斗浸七日每服一小錢熱服不計時

治婦人血風走注腰髀脚膝疼痛

葇蓉子

川烏頭

附子

各一兩

右為細散酒煎成膏攤於帛上於痛處貼之多年者不過三日上効

狼毒丸

治婦人血風攻疰腰脚背膊疼四肢煩倦麻

木兼丈夫原臟風攻身痛拘急腰脚無力

天南星

狼毒

海桐皮

黑附子

炮各等分又
一法更加牛

焙膝

右件各用童子小便浸安著盞子內浸一宿漉出控
乾杵為末酒糊為丸如桐子大每日空心獐猪膽汁
十餘滴炒葱根煎酒下二十丸只是酒亦得如有孕
不可服之

推山丸

治婦人一切走注疼痛

蒼朮

酒浸炒
四兩

乾薑

炮

厚朴

薑製

川椒

炒
一兩

右為末酒糊為丸每服三十九溫酒下

血風驚悸

附論

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸臟之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼治之排風湯亦可儒門事親驚論云衛德新之妻旋中宿於樓上夜值盜劫燒舍驚墮床下自後

每聞有響則驚倒不知人家輩躡足而行莫敢冒觸有聲歲餘不瘥諸醫作心病治之人參珍珠及定志丸皆無効戴人見而斷之曰驚者為陽從外入也恐者為陰從內出也驚者為自不知故也恐者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽傷矣乃命二侍女執其兩手坐於椅當面前下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦大驚戴人曰我以木擊几何必驚乎伺少定擊之驚少緩又斯須連擊三五次又以杖擊門

又暗遣人畫背後之窓徐徐驚定而笑曰是何治法戴人曰內經云驚者平之平者常也平常見之必無驚是夜使人擊其門窓自夕達曙夫驚者神上越也從下擊几使之下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不善戴人至是終身厭服如有人言戴人不知醫者執戈以逐之

方

鎮心珍砂丸 治婦人血風氣壅多驚悸頭目旋痛煩

熱恍惚

珍砂

一兩半細研水飛過

龍腦

一分細研

牛黃

半兩細研

龍齒

一兩

天竺黃

一兩細研

虎睛

二對酒浸一宿微炙

地骨皮

三分

白殭蠶

微炒

紫石英

一兩細研水飛過

馬牙硝

一兩細研

金箔

銀箔

各細研一百片

赤箭

一兩

當歸

三分剉炒

麝香

半兩細研

犀角屑

遠志

去心

鉛霜

細研

人參

去蘆

獨活

甘菊花

防風

去蘆

子芩

各一兩

茯苓

神麥門冬

去心焙各半兩

蔓荊子

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服
十九食後及臨臥時以荊芥薄荷湯內入淡竹瀝半
合嚼下

酸棗仁散 治婦人血風心神驚悸頭痛眠卧不安四
肢煩疼不思飲食

酸棗仁三分 犀角屑兩半 黃耆三分 赤芍藥

三分 枳殼兩半 防風兩半 當歸微
黃去黃穰 炒微 蘆頭兩去 微

炒 細辛兩半 茯苓兩一 龍齒三分 獨活兩半 桑

根白皮一兩

子芩三分

麥門冬去心三分

石膏二兩

人參

一兩去蘆

羚羊角屑三分

甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一盞入生薑半分棗三枚煎六

分去滓不計時候溫服

鐵精散 治婦人血風心氣虛驚悸喜忘不能進食

鐵精

生乾地黄

遠志去心各一兩

桂心剉三分

黃耆

剉

紫石英

細研各一兩

防風去蘆

當歸剉微炒

麥門冬

去心各三分

人參去蘆

白茯苓去皮

茯神各一

兩

甘草

炙微赤剉

白朮

羌活

各兩半

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不計時候

人參散 治婦人血風心氣煩驚悸恐懼恍惚神思不定少欲飲食四肢疼痛

人參

一兩去蘆

遠志

半兩去心

當歸

三分剉微炒

附子

半兩

炮裂去
皮臍

細辛

桂心

乾薑

炮剉

防風

去蘆各半兩

龍齒

一兩

菖蒲

半兩

茯神

一兩

黃耆

剉半兩

白

朮

熟乾地黄

兩

甘草

一分炙
微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不拘時溫服

防風散 治婦人血風煩熱心神驚悸筋脈拘急肢節疼痛不思飲食

防風

三分
去蘆

人參

一兩
去蘆

茯苓

兩

遠志

半兩
去心

細辛

兩

羚羊角屑

生乾地黄

赤芍藥

各三分

沙參

去蘆

白朮

酸棗仁

微炒

桂心

各半兩

獨

活兩

甘草

半兩炙
微赤剉

當歸

三分剉
微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不拘時溫服

紫石英散

治婦人血風心神驚悸恍惚失常或瞋恚

悲愁志意不樂

紫石英

細研
三分

白石英

細研
三分

朱砂

三分細研
水飛過

人參

去蘆
三分

琥珀

天雄炮裂去
皮臍

犀角屑

各半
分

遠志

去心
三分

生乾地黄

沙參去
蘆

桂心

各半
兩

茯神一兩

防風三分去蘆

麥門冬

去心焙一兩半

龍齒一兩

右為細末每服一錢溫酒調下不計時候

龍齒丸 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不安

龍齒研

茯神各一兩

朱砂研

人參 當歸

天麻各二分

犀角屑

檳榔一分

防風各半兩

遠

志去心一分

生地黄兩半

赤箭一分

麝香錢一

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服二十九丸薄荷溫酒

調下

人參散 治婦人風邪驚悸恍惚不安

人參

遠志

心去

赤小豆

炒

白茯苓

皮去

細辛

去苗

桂皮

去

乾薑

炮

防風

熟乾地黃

焙各一兩

半

龍齒

研半兩

黃耆

炙剉一兩半

菖蒲

洗剉焙

白

朮

各三分

右為散每服二錢溫酒調下一日三次

人參丸

治婦人風邪驚悸神思不安

人參

二兩

桂皮

去

防風

牛膝

酒浸切焙

桔梗

炒

遠志

心去

乾薑

炮

白茯苓

皮去

白朮

各一兩

大

黃

蒸熟半兩

金銀箔

各十片研入

右搗羅十味為末金銀箔細研和入煉蜜為丸梧桐

子大每服二十丸生薑薄荷湯下

茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神

去木

人參

龍齒

別研一作龍骨

獨活

酸棗仁

炒各一兩

遠志

心去

桂心

皮去

細辛

白朮

各三分

甘草

乾薑

炮各半兩

防風

三錢

右為末每服四錢水盞半煎八分去滓溫服一方有

龍骨

丹砂丸

出聖濟總錄

治婦人心氣不足被風所乘驚悸不

已

丹砂

別研

雄黃

別研

龍齒

去土研

羚羊角屑

各半兩

菖蒲

洗剉焙一兩

遠志

去心半兩

羌活

去蘆

獨活

去蘆

升麻

芎藭

沙參

防風

右搗羅十味為末入丹砂雄黃和勻煉蜜丸如梧桐

子大每服二十九溫水下 一日三服

茯神湯

出聖濟總錄

治婦人心氣怯弱感於邪風驚悸不

安

茯神

石膏

槌碎

麥門冬

人參

龍齒

去土

升

麻

枳殼

去穰麩炒

沙參

赤芍藥

甘草

炙

羌

活

去蘆

防己

各一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服日再服

遠志散

出聖
愈方

治婦人血風心氣不足驚悸言語謬訛

恍恍惚惚心中煩悶

遠志半兩

茯神兩

獨活兩

甘草

半兩炙
微赤剉

白

芍藥

當歸

剉微
炒

桂心

各半
兩

麥門冬

去心
三分

人參

一兩去
蘆頭

附子

半兩炮裂
去皮臍

黃耆

一兩
剉

羚羊

羊角屑

兩

右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎六分去

滓不計時候服

玳瑁丸

出聖惠方

治婦人血風心神煩熱恍惚多驚不得

睡臥

生玳瑁屑

一兩

琥珀

一兩

生金屑

半兩研

自然銅

半兩研

不灰木

一兩用牛糞火燒令通赤

珍珠末

一兩

犀角

一兩

鐵粉

三分細研

牛黃

一分細研

朱砂

水飛過

龍

腦麝香

各一分細研

右為末入研了藥重研令勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服五丸煎麥門冬湯嚙下不拘時候

鎮心丸

出聖惠方

治婦人血風氣壅多驚悸煩躁

鎮精

三分

人參

去蘆

茯神

各一兩

龍齒

三分

金箔

一分

鉛霜

一分與金箔同研細

銀箔

紫苑

三分去苗

麥

門冬

一兩半焙

甘草

炙微赤剉

黃芩

各半兩

生乾地黄

一兩

右為末入研了藥同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大
每服十九丸食後煎淡竹葉湯下

麥門冬湯

出聖濟總錄

治婦人心氣虛弱為風邪所乘驚

悸不定

麥門冬

焙去心

白茯苓

去皮

人參

防風

當歸

焙切

芎藭

紫苑

去苗土各一兩

桂皮

紫石英

研各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不計

時候

紫石英飲

出聖濟總錄

治婦人風邪驚悸不定

紫石英

研

防風

去蘆

白茯苓

去皮

人參

當歸

焙切

麥門冬

去心略炒

遠志

去心

赤芍藥

細辛

去苗

葉

羌活去蘆

黑豆炒去皮各一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

防風湯出聖濟總錄

治婦人驚悸安神定志解風邪

防風去蘆

人參 遠志去心

桂皮去

獨活去蘆

甘

草炙各一兩

茯神去木一兩半

細辛去苗葉

乾薑炮

白朮

剉炒

酸棗仁炒各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服日二

服夜一服

羚羊角湯

一名作散
出聖惠方

治婦人風邪驚悸心神恍惚

羚羊角屑

生熟地黄

人參

各一兩

茯神

去木三分

黃耆

炙剉
半兩

麥門冬

去心
焙

防風

去蘆各
三分

桑

根皮

剉
炒

甘草

炙剉各
半兩

右麝搗篩每服四錢以水一盞生薑竹葉各五片煎

七分去滓服不拘時候

補心湯

出聖濟
總錄

治婦人心氣不足汗出煩悶驚悸不

寧

麥門冬

去心焙乾三兩

紫石英

研一兩一分

紫苑

去苗土

桂

去粗皮各二兩

赤茯苓

去皮

甘草

炙各一兩

赤小豆

三分

人參

三分

右麤搗篩每服三錢水一盞入大棗二枚擘煎七分

去滓溫服一日二服

藥珍丸

出聖濟總錄

鎮心安神去邪氣止驚悸及治婦人

血攻寒熱憂成病等

丹砂

一兩一分鳳尾草握水研計煮一食久水乾研

桃仁

去皮尖雙仁四十九粒生

研

安息香

一分蜜一分酒少許同煮成膏

麝香

研二錢

阿魏

研

木香

搗各半兩

牛黃

研一錢

附子

一錢半紙裏煨搗

右和丸如大豆每五七丸婦人挑心醋湯下丈夫挑心鹽湯下有人因悲憂病腹中有塊如拳每相衝擊則悶絕服此藥即愈

寧志膏

出大全良方

治婦人失血過心神不安言語失常

不得睡

辰砂

研

酸棗仁

炒

人參

白茯苓

去木

琥珀

研各
一分
滴乳
錢一

右為末和停每服一錢濃煎燈心湯空心調下又方
濕茯苓琥珀蜜丸彈子大薄荷湯化下一丸

血風攻脾胃不能食

附論

夫脾象於土為中州意知之臟也其肝心肺腎皆受脾
之精氣以勞養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為
水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人血氣不
調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛

為邪所乘則不能摧伏五穀故冷不能食也

方

芎藭散

出聖惠方

治婦人血風攻脾胃心腹氣壅悶痰逆

不下飲食四肢少力

芎藭

枳實

麩炒微黃

藿香

赤箭

赤茯苓

訶

梨勒皮

各三分

白朮

人參

去蘆

半夏

湯浸七次去滑

桂心

前胡

去蘆

甘草

炙微剉各半兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓

溫服不計時候

訶梨勒散

出聖方

治婦人血風攻脾胃腹脇妨悶四肢

煩疼或時痰逆不下飲食

訶梨勒皮

陳橘皮

湯浸去白剉焙各一兩

藿香

赤茯苓

苓

芍藥

各三分

桂心

白朮

細辛

當歸

剉碎

微炒

甘草

炙微赤剉各半兩

人參

去蘆半兩

半夏

湯洗七次去滑

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去

滓溫服不計時候

草豆蔻散

出聖惠方

治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不思

飲食

人參兩一

草豆蔻

麩裏煨

白茯苓

半夏

各三兩

良薑

白朮

砂仁

枇杷葉

去毛

桂心

去皮

木

香

青皮

甘草

右為散每服三錢水一大盞薑三片煎七分去滓溫服

神麴丸

出聖惠方

治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲

食

白朮

附子

炮

枳殼

製一作枳實

訶子

一方用訶梨勒皮

桂心

人參

木香

食茱萸

炮

陳皮

各一兩

苦梗

乾薑

各半兩

神麴

二兩

右為末以酒煮神麴末作糊為丸如梧桐子每服二十丸空心薑湯下

藿香散

出聖惠方

治婦人血風氣攻脾胃不思飲食

藿香

桂心

各一兩

厚朴

一兩半去綿皮塗生薑汁炙香熟

白

朮

白豆蔻

去皮

人參

去蘆

橘皮

湯浸去白穢
焙各一兩

神麴

微炒

訶梨勒皮

香附子

各半兩

右為末每服一錢溫酒調下不計時候一方用丁香

椒紅丸

出聖惠方

治婦人血風氣攻脾胃臟腑虛冷全不

思飲食臍腹多痛體瘦無力

椒紅

沈香

附子

炮

莪茂

訶子

當歸

白朮

各一兩

良薑

白豆蔻仁

丁香

各半兩

麝

香

一分

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大空心溫酒下三

十丸

紫桂丸

出聖惠方

治婦人血風氣攻脾胃腹脇疼痛不能

食

桂心

一兩半

當歸

剉微炒

白朮

訶梨勒皮 木

香

食茱萸

芎藭

枳殼

麩炒微黃

椒紅

微炒各一兩

右為末以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九

食前生薑湯下

傷寒 附論

夫古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相行氣口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通浹然汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣言不可下也小柴胡湯治之若行湯遲則熱入胃令津燥中

焦上焦不榮成血結胃狀須當針期門也五行相尅以生相扶以出平居之日水常養於木水相生則養榮血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生剛燥生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小腹滿小便赤利屬抵當湯證也傷寒胃實譫語宜下之婦人熱入血室譫語者不可下也雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先調氣女子先調血此大畧之詞耳要之脈緊無汗名傷寒脈緩有汗為傷風熱病脈洪大中暑脈細弱其證一

也假如中暍用白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯耶仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在學者皆可隨病於男子藥證中以意選用也夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表發於陰者宜溫裏陽脈必浮數陰脈必沈細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾證不復繁引嘗治一婦人但惡寒別無他證六脈平靜遂用敗毒散而安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家

慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相搏脈道沈伏愈令病人寒不可遏但去被撤火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱冒三者大便難亡血復汗寒多故令鬱冒又曰產婦人鬱冒其脈微弱不能食大便堅所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以此觀之鬱冒為虛寒可知矣又或少陰病下利止而頭眩時時自冒者又為

死證蓋謂其虛極而脫也觀其鬱冒幸勿忽焉產婦傷寒或婦人傷寒可得聞與曰傷寒三百九十七條一百一十三方此張氏截然之筆削也於某證則有某藥曷嘗以男子為別哉要之月事來產前產後男子所無請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人發熱惡寒經水適來經曰熱除續生寒熱而胃滿譫語者是則邪氣結於胃膈隨其實而取之傷風經曰續生寒熱發作似瘥而經水適斷者是則血結不行當以小柴胡湯散之所謂治

之而愈者此也經曰如傷寒發熱經水適來晝醒暮譫如見鬼狀是裏無留邪氣隨血行所謂不治自愈者此也前吐血方血歸條併於犀角地黄湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類言之詳矣抑產前產後治將何擇焉曰產前安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何桑寄生阿膠縮砂烏藥他如桂枝半夏桃仁大黃墮胎入燥熱等輩則不可輕用也消瘀者何川芎蒲黃赤芍藥生地黃為要藥他如內補攔住敗血之劑

則不可輕進也朱氏以阿膠桑寄生人參茯苓白朮等
為細末糯米飲調劑為孕婦安胎以紅花一分官桂芍
藥甘草半夏薑棗同煎為解散表消瘀以葱白生薑大
劑濃汁為產前發散以小柴胡湯去半夏和解熱入子
宮郭稽中路枳殼防風甘草半夏點服主之大便秘澀
以蜜道一法真可活人然則產婦證治觀之可以問津
索塗矣雖然知安胎則不可不調氣知消瘀則不可不
扶虛枳殼香附陳皮以調氣也當歸川芎黃耆人參以

扶虛也退熱則柴胡黃芩解肌則紫蘇乾葛滋腸則麻仁枳殼助陽則乾薑良薑其間採摭雖未補古人之經然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人之意姑存之篇末以便學者之觀覽云男子傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景王叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄略而論及言寡婦者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼孀婦

獨陰無陽欲男子而不可得是以懨懨成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘡疾久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黥疲倦等證皆寡婦之病証其脈獨肝脈弦出寸口而上魚際究其脈候其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

方

桂枝紅花湯

出大
金良方

治婦人傷寒發熱惡寒四肢拘

急口燥舌乾經脈凝滯不得往來

桂心

桂枝亦
可二兩

芍藥

二兩

甘草

三兩

紅花

二兩

右咬咀每服五錢水一盞半薑四片棗六箇煎七分去渣溫服良久再服汗出而解

黃芩芍藥湯

出活
人書

療婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思

飲食

黃芩白芍

白朮

生乾地黃

各一兩

右咬咀每服半兩水一盞煎七分去渣溫服寒則加生薑

當歸湯

出活人書

治婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰

陽俱虛不可下

柴胡 白朮 人參 甘草 赤芍藥 當歸

各二

兩

五味子 木通

各半兩

右咬咀每服半兩水一盞半生薑四片棗二枚煎八分去渣熱服

瀉心三黃湯

出大全良方

治婦人傷寒六七日胃中有燥

屎大便難煩躁譫語目赤毒氣閉塞不得通

川大黃 鼠尾黃芩 鷹爪黃連等

右為粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣增損理中丸大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參 白朮 枳實 牡蠣各二兩 甘草炒三兩

乾薑

炮一兩半

枳實

炒二十箇

黃芩

去枯一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大湯一盞煎服不歇與之
不過五六啗中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者加
枯萐根汗者加牡蠣無枳實用枳殼亦可

桂枝加芍藥當歸湯

出拔萃方

治婦人傷寒脈浮頭腫自

利腹中切痛不可忍

桂枝

芍藥

當歸

各一兩

右剉細每服一兩水煎服

荊芥散

出濟生拔萃方

二三日後經水復行前證俱退宜小

柴胡湯一料加荊芥穗五錢

右用枳實麩炒去穰五錢為粗末同小柴胡湯法

防風湯

出濟生拔萃方

三二日後宜正脾胃之氣兼除邪

蒼朮

兩四

防風

兩三

當歸

兩一

羌活

兩一
半

右為粗末水煎服

麻黃加生地黃湯

出濟生拔萃方

治婦人傷寒脈浮而緊頭

疼身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室

麻黃

兩二

桂枝

兩一

甘草

兩半

杏仁

二十五箇
去皮

生地一兩

右剉細每服五錢水煎服

小柴胡加葛根湯

出濟生
拔萃方

治婦人傷寒太陽經傳表

証仍在而自利併陽明也

柴胡兩

甘草六錢

大棗二枚

人參二錢

黃芩去枯

三錢

生薑三分

葛根三分

右剉細每服一兩水煎服

桂枝加附子紅花湯

出濟生
拔萃方

治婦人傷寒頭痛自汗

四肢拘急脈沈而遲太陽標與少陰本病經水適斷

桂枝

二兩半

芍藥

生薑

各一兩半

甘草

一兩炙

附

子炮

紅花

各五錢

右剉細每服一兩水三盞煎服

小柴胡丸芒硝大黃湯

出濟生拔萃方

治婦人傷寒頭痛脈

浮醫反下之邪氣虛而傳於裏經水閉而不行心下

結硬口燥舌乾寒熱往來言如見鬼狀脈沈而數即

可下

柴胡二兩

黃芩七錢半

半夏製一兩五錢

甘草七錢半

大黃七錢

芒硝七錢

大棗三枚

生薑七錢半

右剉細每服一兩薑同煎去渣下硝再沸溫服脈不沈即不可下

金沸草散 治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋脈急發寒熱皆類傷風

荊芥穗二兩

半夏

甘草

北細辛各一兩

小茯

苓二兩

前胡

旋覆花各三兩

右為細末每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎六分
熱服之再服局方有麻黃赤芍藥無細辛茯苓

青竹茹湯 治大人病未平復因有所動致熱氣上衝

冒手足拘急搐搦如風狀宜此湯亦治勞復

瓜蒌根

無黃者一兩

青竹茹

刮半斤淡竹是

右以水升半煮取一升二合去滓分二三服

當歸白朮湯

出活人書

治婦人未平復因有所動小腹急

痛腰胯痛四肢不仁舉動無力發熱亦治勞復

芍藥 黃耆 人參各二錢半 白朮 當歸 附子

生 桂枝 甘草 生薑

右剉以水三升煮取一升半去滓通口服一盞食頃
再溫服微汗差

生地黃丸

出永類
鈴方

治患惡風體倦乍寒熱面赤心煩

或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之小
大柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部無寒邪
脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製

此方治之愈

北柴胡

秦艽

黃芩

各半兩

生地黃

二兩

赤芍

藥

一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大烏梅煎湯下三十丸無時候日三服

附朮散

出危氏方

治傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止

項強直搖頭口噤時發時止不食下瀉者難治

附子

白朮

各一兩

川芎

三錢

肉桂

二錢

獨活

半兩

右為細末每服三錢棗二枚水一中盞煎至一半溫服

桂枝加芍藥湯

出濟生拔萃方

治婦人傷寒中風自汗頭痛

項背強發熱惡寒脈浮而緩恐熱入血室故倍加芍藥

桂枝兩

赤芍藥

三兩半

生薑

一兩半

大棗

六枚

右剉細每服五錢水煎服

葛根湯

出產經

治剛瘧無汗惡風產後有疾凡麻黃更

宜斟酌產後五七日強力下床或一月內傷於房室
或懷憂發怒擾蕩沖和或因着灸傷動臟腑得病
之初眼澀口噤肌肉睵搖以漸腰脊筋急強直似
弓反張不可治乃人作偶爾中風所得然麻黃終
宜酌用

葛根

兩一

麻黃

去根節炮

殭蠶

各三分

桂枝

粉草

芍藥

各半兩

大棗

三枚

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服取汗

為度活人等書六卷十三問答曰新產血虛多喜
中風當察其有寒以分剛柔二症無汗惡寒名曰
剛症有汗不惡寒名曰柔症若有汗桂枝加葛根
湯

桂枝加葛根湯

出產經

治柔症有汗不惡寒

桂枝 芍藥

甘草

各六錢
三字

乾葛

一兩
三分

生

薑

兩一

棗

四箇

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去渣溫服取汗

為度又曰剛柔二症小續命湯皆治若有汗去麻黃
加乾薑當月增損法調治骨節酸疼去附子加芍藥
精神恍惚加茯苓遠志心煩多驚加犀角嘔逆腹痛
加人參半夏骨間疼痛加附子宮桂臟寒下利去防
己黃芩加附子白朮燥悶大便急去附子加芍藥入
竹瀝

桂心白朮湯

出大全良方

治傷寒陰症手足厥冷筋脈拘

急汗出不止

白朮 桂心 附子炮 防風 川芎 甘草各半

右咬咀每服五錢水二盞薑四片棗三枚煎八分去渣溫服

附子防風散出大全良方 治傷寒陰痿手足厥冷閉目合

面筋脈拘急汗出不止

柴胡一兩半 五味子 白朮各一兩 茯苓 附子

炮 甘草 乾薑 防風各三分 桂心半兩

右為散每服三錢薑四片水一盞煎七分去渣溫服

八物白朮散

出大全良方

治傷寒陰症三日不差手足厥

冷筋脈拘急汗恐陰氣內傷

白朮

麻黃

去根節

茯苓

五味子

羌活

各半兩

附子

炮

桂心

各三分

良薑

一分

右為散每服四錢水一盞薑四片煎七分去渣溫服

凡用麻黃宜斟酌用之不可過多

參蘇飲

出大全良方

治感冒發熱頭痛或因痰飲凝積發

以為熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法連進數服微汗即愈大治中脘痞悶嘔逆惡心開胃進食小兒室女凡宜服之

前胡 人參 紫蘇 乾葛 半夏 茯苓

加二分

枳殼 陳皮 甘草 桔梗 木香

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至六分去滓不以時候素有痰飲者俟熱退以二陳湯或六君子湯間服之男子婦人虛勞發熱或吐衄下

血過多致虛熱者用此藥三兩加四物湯二兩合和
名茯苓補心湯

荊芥散

出拔萃方

療時氣風溫寒熱瘴瘧往來潮熱並宜

服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荊芥穗

厚朴

各二兩

草果仁

三箇

白芷

各一兩

桂心

各半兩

右咬咀每服二錢水一大盞薑三片棗二枚煎七分
去渣溫服無時候

麻黃湯

出危氏方

發散四時傷寒寒熱頭痛時疫

前胡

柴胡

各去毛

石膏

蒼朮

剉炒

藁本

赤

芍藥

白芷

土芎

乾葛

升麻

各五錢

麻黃

三錢

右剉散每服四錢薑三片連鬚葱二根煎不拘時服
春加黃芩夏用正方秋加麻黃冬加豆豉

退陰散

出大全良方

本治陰毒傷寒手足逆冷脈沈細頭

痛腰重連進三服小小傷冷每服一字入正原散內

煎入鹽一捻陰毒傷寒咳逆煎服細細熱呷便止正
原散方見大人科傷寒門身體疼類

乾薑 川芎

右等分為粗末炒令黃色候冷搗為末每服一錢水
一盞鹽一捻煎至半盞服

小柴胡加地黃湯

出聖
愈方

治婦人室女傷寒發熱經水

適來或適斷晝則明了夜則譫語如見鬼狀亦治產
後惡露方來忽爾斷絕

柴胡

一兩一分

人參

半夏

湯洗七次

黃芩

甘草

生地黃

各半兩

右為粗末每用五錢水二盞薑五片棗二枚煎至八

分去渣溫服

三黃熟艾湯

出大全良方

治傷寒四五日大下熱痢時作

服白通湯諸藥多不止宜服此湯能除熱止痢亦有人作丸子熟水吞下四十丸治時行毒痢良驗

黃芩

黃連

黃柏

熟艾

半斤雞子大

右咬咀每服三錢重水一盞煎七分去滓溫服無時亦可作丸子吞下

又方

出直指方

治婦人傷寒嘔逆血繼而齒縫皆流血不

止

開口川椒

四十粒

右用法醋一大盞同煎臨熟入白礬少許嗽口含在口中少頃吐出再啜嗽而含之

又方

出本草

治婦人傷寒得病雖差未滿百日不可

與交合為陰陽之病必筋脈拘急手足拳欲死丈夫
病名為陰易婦人病名為陽易速當下之可痊滿四
日不可療宜令服此

乾薑

兩四

右為末湯調連服以衣被出汗方解手足神安而愈

熱入血室

附論

夫傷寒熱入血室何以明之室者屋室也謂可以停止
之處人身之血室者榮血停止之所筋脈拘會之處即

衝脈是也衝脈者奇經八脈之一脈也起于腎下出于
氣衝足陽明經之血朝會于此男子則運行之女子則
上為乳汁下為血水內經曰任脈通衝脈盛月事以時
下者是也王冰曰陰靜海滿而去血謂衝脈盛為海滿
也即是觀之衝是血室可知矣傷寒之邪婦人則隨經
而入男子由陽明而傳以衝之脈與少陰之絡起于腎
女子感邪太陽隨經使得而入衝之經並足陽明男子
陽明內熱方得而入也衝之得熱血必妄行在男子則

下血譫語在婦人則經水適來陽明病下血譫語此為入血室者斯概言男子不止謂婦人而言也婦人傷寒經水適來與經水適斷者皆以經氣所虛宮室不悶邪氣得乘虛而入針經有言曰邪氣不得其虛不能獨傷人者是矣婦人熱入血室有須治而愈者有不須治而愈者又各不同也婦人發熱中風惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼和骨脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室當刺期門隨其實而瀉之與其婦人

中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故始如瘡狀發作有時小柴胡湯主之者是須治而愈者也婦人傷寒發熱經水適來晝則明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈是不須治而愈者也譫語為病邪之甚者何不須治而愈耶且胃脇滿如結胃謂是邪氣留結于胃脇而不去者必刺期門隨其實而瀉之寒熱如瘡發作有時者是血結而不行者須小柴胡湯散之既

胃有留邪必須治之可也若發熱經水適來晝日明了
夜則譫語此則經水既來以裏無留邪但不妄犯熱隨
血散必自愈經曰血自下者愈故無犯胃氣及上二焦
自愈所謂妄犯者謂恐以譫語為陽明內實攻之犯其
胃氣也此無胃腸之邪恐刺期門犯其中焦也此無血
結恐與小柴胡湯犯其上焦也小柴胡湯解散則動衛
氣衛出上焦動衛氣是犯上焦也刺期門則動榮氣榮
出中焦動榮氣是犯中焦也脈經有曰無犯胃氣及上

二焦豈為藥不謂針耶此其是與

方

小柴胡湯

一名參湯出
衛生寶鑑

治婦人傷風七八日續得寒

熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故
使如瘧狀日晡特甚如見鬼神亦治產後惡露方來
忽時斷絕

柴胡

八錢

半夏

二錢

黃芩

人參

生乾地黄

甘草

各三錢

右劉每服五錢水盞半薑三片棗二枚煎八分去渣
溫服一婦人病傷寒熱遇夜則見鬼狀所患六七日
忽腎塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人疾勢極
微名予視曰得病之初曾阻月經來否其家云經方
來病作而遂得經一二日發寒熱晝雖靜夜有鬼祟
從昨日來不省人事予曰此熱入血室仲景云婦人
中風發熱熱入血室制以柴胡加生地黃湯服之而
熱除不汗而自解矣

乾薑柴胡湯

出永類
鈴方

治婦人傷寒經脈方來初斷寒

熱如瘧狂言見鬼

柴胡

四兩

桂枝

一兩半

枳實根

牡蠣

乾薑

甘草

各一兩

右㕮咀每服五錢水盞半煎至七分去滓溫服初服微煩再服汗出而愈

海蛤散

出活人書

治婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫

近者宜服之凡治血結胃法當針期門仲景無方此

方疑非仲景然其言有理姑存焉

海蛤 滑石

甘草各二兩

芒硝一兩

右為細末每服二錢鷄子清調下小腸通利則胃膈
血散臆中血聚則小腸壅小腸既壅則臆中血不流
行宜此方小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗
自愈又治婦人傷寒三五日七八日月經當行或經
水纔去作寒熱譫語見鬼日輕夜甚此乃熱入血室
右四物加柴胡煎如不退用小柴胡湯入生地黃煎服

小柴胡加牡丹皮湯

出拔萃方

治婦人傷寒身熱脈長而

弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁晝寧如見神狀經水

適斷熱入血室大實滿者桃仁承氣湯實者宜服此

柴胡

二兩

黃芩

七錢半

人參

二兩

半夏

六錢

大棗

三枚

甘草

七錢半

生薑

七錢半

牡丹皮

二兩

右剉細每服一兩生薑一同煎

甘草芍藥湯

出拔萃方

治婦人傷寒凡陽標病汗解表除

邪熱內攻熱入血室經水過多無滿實者

甘草芍藥

生地黄

川芎

四味各一兩

右剉細每服一兩水三盞煎至一盞半去滓入梔灰

五錢調勻溫服不止者刺隱白

乾地黄湯

出活人書

治婦人傷寒差後猶有餘氣不調之

遺熱

乾地黄一兩

大黃

黃連

黃芩

柴胡

白芍

藥

甘草

各兩半

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服取瘳

三黃丸

出危氏方

治婦人傷寒棄衣而走不避親疏妄言

罵語

右即以三黃丸別研辰砂為衣新汲水下十丸効未効再服

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人者

牛黃

二錢半

朱砂

鬱金 各二錢

腦子

甘草

各一

錢

牡丹皮

二錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大新汲水下

紫苑湯 治婦人熱入血室身熱發作有時咳痰脇下痛嗜臥不食

紫苑

一兩

續斷

炙

熟地黄

桔梗

各二兩

五味

子竹茹

赤豆

甘草

桑白皮

各一兩

右九味以水七升煮取六升去滓再煮取三升溫服一升

生地黃湯

治婦人熱入血室其血不止者

生地黃

續斷

白朮

各一兩

甘草

紫菊葉

各半

兩

右五味以水三升煮取一升五合去滓溫服五合

霍亂附論

夫嘔吐而利者名霍亂也原疾之起皆由腸胃虛冷飲食逆度觸胃氣風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍變亂也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱作或頭痛身體壯熱而脈浮洪者或陽氣暴絕而手足逆冷而脈息微絕者治之當分其陰陽察其虛實辨其

冷熱觀其脈息熱者涼之冷者溫之以平為期凡霍亂吐利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸吐利已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯夏月中暑霍亂煩渴四肢逆冷服即効丸霍亂之脈得浮洪者易治微遲者并氣短者難治

方

訶子散 治老幼霍亂吐利一服取効及治九種心痛并心腹冷痛不可忍者

訶子 甘草 厚朴 乾薑 草果仁 陳皮

良薑 茯苓 神麴 麥芽

各等分

右為細末每服二錢候發刺痛不可忍用水一盞煎七分入鹽服急則鹽點

甘草瀉心湯 治婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其涎沫可服小青龍湯涎沫止次治其痞

甘草

四兩

乾薑

黃芩

各三兩

黃連

一兩

半夏

半斤

大棗十二枚

右咬咀以水一斗煮取六升分六服

加減理中丸 治霍亂臨時亦可治男子

人參 白朮 乾薑 甘草各一兩

右為細末煉蜜為丸每兩作五丸取湯和一九服之
吐多利少者取枳實三枚炙去穰四破水三升煮取
一升和一九服之吐少利多者加乾薑一倍吐利乾
嘔取半夏半兩泡洗去滑水二升煮取一升和丸服

若疼痛不可堪者水三升煮棗三枚取一升和丸服
若吐利太劇轉筋者以韭汁洗外腎從胷至足踝勿
逆即止若體疼微汗腹中寒取附子一枚炮去皮四
破以水二升煎一升和服一丸吐利悉止脈下出體
猶冷者可服諸湯補之

四逆加猪膽汁湯 治吐已下斷汗出而厥四肢拘急
不解脈微欲絕者

甘草二兩

乾薑

三兩

附子

一枚生

猪膽汁

半合

右呔咀每服五錢水三盞煮至二盞去滓內猪膽汁
分作兩次溫服其脈即來

香薷散 治臟腑不調飲食不節或食腥膾生冷過度
起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸
於三焦傳於脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相
干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便至吐利心
腹疼痛霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而利
者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩

者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷脈微欲絕者或煩悶昏塞欲死者妊婦霍亂吐利能主之

香薷葉

四兩

白扁豆

厚朴

各二兩

右咬咀每服半兩水一盞酒一分慢火濃煎至六分去渣冷水浸冷頻服無時候連進二三服効一方加黃連四兩用薑汁炒令黃色名黃連香薷散如搗搗加羌活煎

胡椒湯 治霍亂吐利

胡椒

四十粒

綠豆

一百四十粒

右為細末木瓜煎湯調下二錢

入方 治霍亂困篤

取用童女月經衣和血燒灰酒服方寸匕

普濟方卷三百十八